AUSAR
FORMAZIONE
Via P. Mancini 11b 87040 Castellibero CS

**ICTUS: Aspetti diagnostici,
clinici, riabilitativi**

**SABATO 6 E DOMENICA 7
GIUGNO 2015**

**IL VALORE DELLA TERAPIA
OCCUPAZIONALE NELLA
RIABILITAZIONE POST-ICTUS**

L'esperienza di una Struttura riabilitativa locale

Dott. Domenico Mauro
Psicologo-Psicoterapeuta

SOMMARIO

- DEFINIZIONI
- OBIETTIVI
- CONCETTI CARDINE
- LA RELAZIONE TERAPEUTICA
- LA VALUTAZIONE
- PRINCIPI DI TRATTAMENTO
- L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
- LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
- MODALITA' DI INTERVENTO
- PROTOTIPO DI INTERVENTO
- RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

DEFINIZIONI

- La **terapia occupazionale**, definita anche ergoterapia, è una disciplina riabilitativa atta a sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisiche e psichiche **attraverso attività**.
- Si occupa anche dell'individuazione e dell'eliminazione di barriere ambientali per favorire l'autonomia, l'indipendenza e la partecipazione alle attività quotidiane, lavorative, sociali.

-
- Secondo la definizione dell' OMS, la terapia occupazionale “è l'arte e la scienza di dirigere la risposta dell'individuo verso attività selezionate per promuovere e mantenere la salute, per prevenire la minorazione, per valutare il comportamento e per trattare o allenare i pazienti con disfunzioni fisiche e psicosociali”

-
- DEFINIZIONI
 - **OBIETTIVI**
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

OBIETTIVI

- 1. Promuovere benessere e salute della persona attraverso l'occupazione;
 - 2. Rendere la persona capace di partecipare alle attività della vita quotidiana.
-
- Ciò si può riassumere anche in un unico grande obiettivo: potenziare la capacità di azione della persona negli ambiti inerenti all'autonomia e all'indipendenza, alla produttività e al tempo libero nel contesto in cui vive, per favorire benessere e salute.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - **CONCETTI CARDINE**
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

CONCETTI CARDINE

- ATTIVITÀ: lo scopo generale della terapia occupazionale è il miglioramento della capacità di azione; poiché la capacità di azione si sviluppa attraverso l'attività, in terapia occupazionale l'azione diviene, contemporaneamente, obiettivo e strumento terapeutico;
- Le attività quotidiane sono considerate, ancora, strumento diagnostico e, al contempo, strumento di intervento.

-
- **INDIVIDUO**: al centro dell'attività in terapia occupazionale c'è l'individuo con i suoi interessi e le sue esigenze in termini di capacità di azione, partecipazione e qualità della vita; quando è possibile il terapeuta occupazionale definisce l'obiettivo del suo intervento insieme al cliente pianificandolo e valutandolo assieme a lui.
 - **QUOTIDIANITA'**: Il terapeuta occupazionale definisce le attività importanti per il suo cliente in termini di autonomia, produttività e tempo libero nella quotidianità.

-
- **AMBIENTE**: Ogni persona vive la propria quotidianità in contesti ambientali. Tali contesti si classificano in due gruppi: *ambiente circostante* o *fisico* (oggetti, tempo, spazio, clima etc.); *ambiente sociale* (associazioni, vicinato, persone, cultura, mentalità etc.).
 - Poiché l'ambiente può favorire o inibire le attività di vita quotidiana, modificando l'ambiente è possibile intervenire positivamente sulla capacità di azione e sulla salute.

-
- **QUALITA' DELLA VITA**: la qualità della vita è strettamente connessa sia alla capacità di azione della persona (aspetto soggettivo) sia al suo ambiente circostante (aspetto oggettivo).
 - **IN SINTESI**: *L'elemento centrale della terapia occupazionale è la persona che ha necessità di sviluppare o recuperare la propria capacità d'azione, per migliorare la qualità della vita nell'ambiente in cui si inserisce.*

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - **LA RELAZIONE TERAPEUTICA**
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

LA RELAZIONE TERAPEUTICA

- La T.O. è una delle professioni che offre una relazione d'aiuto ai suoi pazienti.
- La “*domanda*” rappresenta l'inizio del lavoro e anche l'inizio della relazione terapeutica.
- Essa è fondamentale per l'intervento della T.O. e si esprime *con e nella* relazione terapeutica.
- Nella relazione terapeutica vengono espresse molte emozioni (che accompagnano anche il “fare”), le stesse suscitate dalla disabilità e dalla sofferenza.

-
- L'emotività, nella relazione terapeutica, deve essere colta, contenuta e “trasformata” in “energia positiva”, utile alla crescita;
 - Il terapeuta occupazionale deve essere in grado di accogliere empaticamente le emozioni quando vengono espresse;
 - Solo all'interno di una adeguata relazione tra terapeuta e paziente tali emozioni acquisiscono un valore terapeutico.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - **LA VALUTAZIONE**
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

LA VALUTAZIONE

- Per poter elaborare un programma di Terapia Occupazionale, il Terapista effettua un'ampia e specifica valutazione.
- Essa serve a rilevare lo stato nel quale si trova il paziente, il tipo e l'influenza del disturbo sulle sue azioni e sul suo comportamento, le sue aspettative, così come le sue condizioni di vita, personali e sociali.

-
- In particolare, attraverso operazioni quali:
 - *Osservazione diretta del comportamento;*
 - *Interviste al caregiver;*
 - *Intervista al paziente.*
 - E' necessario valutare:
 - *abilità motorie;*
 - *abilità di processo;*
 - *abilità di interazione sociale.*

- **ABILITA' MOTORIE:**

Funzioni che permettono alla persona di muoversi.

- Parole chiave:

- *Raggiungere*

- *Manipolare*

- *Inclinarsi*

- *Muovere*

- *Camminare*

- *Trasportare*

- **ABILITA' DI PROCESSO:**

Permettono alla persona di organizzare il proprio agire.

- Parole chiave:

- *Organizzare*

- *Iniziare*

- *Mettere insieme*

- *Cercare*

- *Continuare*

- *Adattare*

- **ABILITA' DI INTERAZIONE SOCIALE:**

Sono azioni osservate nel momento in cui la persona che agisce, comunica o interagisce con gli altri.

Parole chiave:

- *Sostenere*
- *Chiarire*
- *Prendere la parola*
- *Rivolgersi a ...*

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE OCCUPAZIONALE

- **ADL** (ACTIVITIES OF DAILY LIVING): Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana;
- **IADL** (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING): Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana
- **INDICE DI BARTHEL**: scala di valutazione delle attività della vita quotidiana;
- **PPT**: (*Physical Performance Test*): test di osservazione diretta in attività;

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - **PRINCIPI DI TRATTAMENTO**
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO

- ***TRATTAMENTO INCENTRATO SUL PAZIENTE***
- Al centro della T.O. c'è il paziente, con il suo “mondo”, la sua vita e le sue esigenze;
- Il paziente ha un ruolo attivo nel processo terapeutico;
- La terapia Occupazionale si attua attraverso l'instaurazione di un'adeguata relazione tra terapeuta e paziente.

- ***TRATTAMENTO INCENTRATO
SULL'OCCUPAZIONE***

- Le occupazioni sono vitali per l'identità di un individuo (Jackson, 1998) e sia i mezzi che il fine (gli obiettivi) della T.O. si basano su interventi motivati dalle occupazioni del paziente (Fischer, 1998; Gray, 1998; Trombly, 1995).

- ***TRATTAMENTO BASATO SULLE PROVE SCIENTIFICHE***

- Per soddisfare la crescente tendenza in ambito sanitario di *basare gli interventi sulle migliori prove scientifiche*, in Terapia Occupazionale è necessario accedere, valutare e interpretare la ricerca pertinente all'attività;
- Bisogna, inoltre, raccogliere dati validi a sostegno dell'intervento.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - **L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE**
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

L'INTERVENTO DELLA T. O. NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON STROKE

- Recuperare le abilità funzionali, le capacità motorie e cognitive;
- Stimolare e mantenere le capacità residue;
- Adattare le limitazioni funzionali presenti e sviluppare strategie compensative;
- Intervenire per l'adattamento dell'ambiente.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - **LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE**
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON STROKE

- Abilità fisiche (es. forza, coordinazione ed equilibrio);
- Abilità cognitive (es. memoria, attenzione, problem solving);
- Abilità socio-emozionali (comunicazione, autostima);

-
- Abilità per la performance della *cura di sé* (es. lavarsi, vestirsi, mangiare), delle *attività domestiche* (es. far la spesa , cucinare, pulire), delle *attività lavorative* e del *tempo libero*;
 - La valutazione comprende, inoltre:
 - L'ambiente sociale (es. famiglia);
 - L'ambiente fisico (es. casa).

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - **MODALITA' DI INTERVENTO**
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

MODALITA' D'INTERVENTO

- Training per l'autonomia nelle attività della vita quotidiana (igiene, vestizione, pasti, spesa, ecc.);
- Training delle capacità sensomotorie (mobilità, coordinazione, forza, percezione del corpo, ecc.);
- Training cognitivo (concentrazione, attenzione, memoria, orientamento, percezione, ecc.);

-
- Stimolazione delle capacità sociali, ed emotive (comunicazione, autostima, creatività, motivazione, ecc.);
 - Consulenza e formazione del paziente e degli altri membri della famiglia riguardo a tutti gli aspetti del programma riabilitativo (anche allo scopo di raggiungere un'adeguata alleanza terapeutica);
 - Consulenza e formazione dei familiari e/o caregiver sulle attività di vita quotidiana al fine di mantenere e/o migliorare l'abilità funzionale del paziente;
 - Formazione all'uso di ausili rivolta al paziente e al familiare e/o al caregiver.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - **PROTOTIPO DI INTERVENTO**
 - RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD

PROTOTIPO DI INTERVENTO

- Il TO tratta il paziente giornalmente per 5 giorni alla settimana per almeno 1 ora;
- Partecipa alle riunioni settimanali del team multiprofessionale;
- Redige dei report in relazione alle valutazioni e al piano di trattamento nelle varie fasi d'intervento.

- *Fase iniziale*

- Intervento in camera per la stimolazione a letto dell'autonomia del paziente, durante l'alimentazione e l'igiene;
- Posizionamento dell'arto superiore;
- Individuazione delle principali aree che necessitano di miglioramento per l'aumento dell'indipendenza funzionale.

- ***Fase di recupero***

- Trattamento specifico:

- Analisi delle problematiche funzionali;

- Training delle *attività di vita quotidiana* (AVQ).

- ***Fase di dimissione***

- Valutazione ambiente domestico/lavorativo;

- Addestramento alle attività domestiche;

- Addestramento e formazione del familiare/
caregiver.

-
- DEFINIZIONI
 - OBIETTIVI
 - CONCETTI CARDINE
 - LA RELAZIONE TERAPEUTICA
 - LA VALUTAZIONE
 - PRINCIPI DI TRATTAMENTO
 - L'INTERVENTO NEI PZ CON STROKE
 - LA VALUTAZIONE DEI PZ CON STROKE
 - MODALITA' DI INTERVENTO
 - PROTOTIPO DI INTERVENTO
 - **RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA SPREAD**

RACCOMANADAZIONI LINEE

GUIDA SPREAD

- Raccomandazione 11.35 Grado A
- Nei pazienti con ictus è indicato integrare fin dalla fase acuta l'attività di prevenzione della disabilità (mobilizzazione ed interventi riabilitativi precoci) con il programma diagnostico ed il trattamento di emergenza.
- Raccomandazione Grado D
- È indicata la mobilizzazione degli arti del paziente con ictus per almeno 3-4 volte al giorno.
- Raccomandazione Grado D
- **È indicato stimolare ed incoraggiare i pazienti con ictus alla partecipazione alle attività quotidiane.**
- Raccomandazione Grado D

-
- Nei pazienti con ictus è indicato favorire la comunicazione con il paziente ed i familiari anche al fine di indicare e far apprendere le modalità di partecipazione al processo assistenziale.
 - Raccomandazione 14.17 Grado A
 - **È indicato attivare programmi di terapia occupazionale a livello territoriale al fine di limitare la progressione della disabilità e migliorare le attività della vita quotidiana**
 - Raccomandazione 14.29 GPP
 - **È indicato un programma a lungo termine di realizzazione autonoma delle attività quotidiane, al fine di limitare il deterioramento del livello di autonomia raggiunto con la riabilitazione intensiva od estensiva.**
 - **Sintesi 15-10 Il trattamento dell'aprassia è mirato a favorire l'autonomia quotidiana promuovendo la capacità di attuare attività funzionali nelle ADL mediante strategie di compenso o di reintegrazione del gesto secondo i modelli neurofisiologici più condivisi.**

-
- **Raccomandazione 15.27 Grado B**
 - È sempre indicato attivare un programma di riabilitazione precoce dell'arto superiore paretico entro i primi tre mesi dall'esordio dell'ictus. L'impiego routinario di protocolli di addestramento ripetitivo e/ o intensivo dell'arto superiore ai fini del recupero funzionale non è indicato.
 - Nei soggetti nei quali persiste un disturbo aprassico dopo la fase acuta, è indicato attuare un programma di trattamento riabilitativo specifico per l'aprassia bucco-faciale o per le diverse forme di aprassia che interessano gli arti.
 - **Prima del rientro a domicilio del soggetto colpito da ictus, è indicato realizzare gli opportuni adattamenti ambientali preventivamente consigliati.**

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A.A.V.V., (2012). SPREAD VII edizione. Ictus cerebrale: linee guida italiane di prevenzione e trattamento. Milano. Pubblicazioni Pierrel Research italy SpA.
- Caracciolo, A., Redaelli, T., Valsecchi, L., (2008). *Terapia Occupazionale. Ausili e metodi per l'autonomia*. Milano. Raffaello Cortina Ed.
- Blessedell Crepeau, E., Cohn, E. S., Boytshell, B. A., (2008). *Terapia Occupazionale*. Roma. Antonio Delfino Ed.
- Cunningham Piergrossi, J., (2006). *Essere nel fare. Introduzione alla Terapia Occupazionale*. Milano. Franco Angeli Ed.
- Canevaro, A., Chierigatti, A., (1999). *La relazione d'aiuto. L'incontro con l'altro nelle professioni educative*. Roma. Carocci Ed.